

対象疾患:EC療法(1コース3週)／乳癌

| 薬品名 | 薬品名(商品名／略号) | 投与量 | 投与経路 | 投与時間 | 投与日 | 投与スケジュール |
|-----------|----------------------|----------------------|------|------|--------|----------|
| エピルビシン | エピルビシン塩酸塩注射用／(EPI) | 90mg/m ² | 点滴静注 | 15分 | day 1 | 3週ごとに投与 |
| シクロホスファミド | 注射用エンドキサン500mg／(CPA) | 600mg/m ² | 点滴静注 | 30分 | day 1. | 3週ごとに投与 |

副作用

| 種類 | 発生頻度 |
|-------------------------------|--------|
| 発熱性好中球減少 | 1.00% |
| 好中球減少(Grade≥4) | 67.00% |
| 貧血(ヘモグロビン Grade≥3) | 14.00% |
| 血小板減少(<20×10 ⁹ /L) | 3.00% |
| 脱毛(All Grade) | 85.00% |
| 吐気・嘔吐(Grade≥3) | 19.00% |
| 下痢(Grade 3) | 1.00% |
| 疲労(Grade 3) | 1.00% |

| | |
|-----------|--|
| 各薬剤の主な副作用 | EPI: 骨髄抑制、悪心、嘔吐、食欲不振、口内炎、脱毛、心毒性(ADRに換算すると約1.5倍量で生じる) |
| | CPA: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、脱毛、出血性膀胱炎不妊、鼻閉、顔面紅潮、皮疹、頭痛、2次発がん |

| | |
|--------|---------------|
| 催吐性 | 高度 |
| 血管への影響 | EPI: 起壊死性抗がん剤 |
| | CPA: 炎症性抗がん剤 |

<参考文献>

J Clin Oncol. 2001 Jun 15;19(12):3103-10. doi: 10.1200/JCO.2001.19.12.3103.

- ・実際の治療は必ずしもこの通りでない場合もあります。
- ・他者への配布や診療、調剤業務、個人的学習以外への利用はご遠慮ください。